

レジメンcode:	C76-02	備考
適応がん種:	原発不明がん	
レジメン名:	Nivolumab (2週間)	
間隔:	2週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	オプジーボ	240	mg/body	点滴(30分)	d1

day1

- 
- 1) 生食 50ml 1本
- ルート確保
- 
- 2) オプジーボ 240 mg/body
- 生食 100ml 1本
- (フィルター必須)
- 主管① 点滴 30分 30分以上かけて投与すること
- 
- 3) 生食 50ml 1本
- フラッシュ用
- 〈所要時間 約1時間〉

【文献】

国内第Ⅱ相試験(NM-K2002試験)Ann Oncol;2022 Feb;33(2):216-226(PMID:34843940)

【オプジーボ】

\*甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれる事があるため、投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査を実施すること。

◎検査セット登録あり:場所 カルテ→(検体)→(特殊セット)→(免疫チェックポイント初回)(免疫チェックポイント2回目～)

\*調製時、又は希釈後に振盪により凝集体が認められることがあるため、バイアルは振盪せず、激しく攪拌しないこと。

\*投与時の総液量は体重30kg未満の患者には100mL以下とする。

\*他剤との混注はしない。

\*特に注意する副作用(間質性肺炎、1型糖尿病、肝機能障害、肝炎、甲状腺機能障害、infusion reaction)。

\*有害事象(肺、肝、内分泌障害、皮膚、胃腸、腎、神経関連)対処アルゴリズムを参照する。