

レジメンcode:	C25-01	備考
適応がん種:	肺癌(進行・再発)	
レジメン名:	S-1+GEM	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
S-1	エスワン	[*]	mg/m ²	内服(朝夕食後)	d1夕~15朝
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8

day1、8【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|--------------|-------|------------------------|-----------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 3) ゲムシタビン | | 1000 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |
- 〈所要時間 約1時間30分〉

day1夕~15朝

- | | |
|---------|-----------------------|
| 1) エスワン | [*] mg/m ² |
| | 内服 朝夕食後 |

[*]

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	朝40mg/回、夕20mg/回 (60mg/日)
1.25~1.5m ² 未満	40mg/回 (80mg/日)
1.5m ² 以上	50mg/回 (100mg/日)