

レジメンcode:	C56-25
適応がん種:	HRD陽性 卵巣癌
レジメン名:	Bv+オラパリブ維持療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	アバスチン[*1]	15	mg/kg	点滴(30分)	d1
	リムパーザ[*2]	600	mg/body	内服(朝夕食後)	連日

[*1]臨床試験ではアバスチンは化学療法併用時と合わせて最長15ヶ月/計22サイクルとした。

[*2]リムパーザの投与開始後2年が経過した時点で完全奏功が得られている患者においては、リムパーザの投与を中止すること。

day1

1) 生食	50ml	1 本			
				ルート確保	
2) アバスチン		15 mg/kg			
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴	30分		
3) 生食	50ml	1 本			
				フラッシュ	
				〈所要時間	約1時間〉

連日

1) リムパーザ	600 mg/body				
	内服	朝夕食後			

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験(PAOLA-1試験)N Engl J Med 2019;381:2416-28(PMID:31851799)

*適応: 相同組換え修復欠損(HRD)を有する卵巣癌におけるベバシズマブを含む初回化学療法後の維持療法