

| | |
|-----------|------------|
| レジメンcode: | C18-17 |
| 適応がん種: | 大腸癌 |
| レジメン名: | CPT-11(B法) |
| 間隔: | 4週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|--------|---------------|-----|-------------------|---------|-------|
| CPT-11 | イリノテカン(トポテシン) | 150 | mg/m ² | 点滴(90分) | d1、15 |

day1、15【ケモセーフ使用】

| | | | | | |
|------------------|--------|-----|-------------------|---|-----------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 | A | | |
| | | | | | ポート確認 |
| 2) パロノセトロン | 0.75mg | 1 | V | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 | V | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 | A | | |
| ブスコパン | 20mg | 1 | A | | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 15 | 分 | |
| 3) イリノテカン(トポテシン) | | 150 | mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管② | 点滴 | 90 | 分 | |
| 4) 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | | | | | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 | 筒 | | |
| | | | | | ルートロック |

〈所要時間 約2時間30分〉