

レジメンcode:	C18-57
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	2wCet
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴[*1]	d1

day1

- |              |       |                       |                                |                  |
|--------------|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 1) 生食        | 20ml  | 1 A                   |                                |                  |
|              |       |                       |                                | ポート確認            |
| 2) デキサート     | 6.6mg | 1 V                   |                                |                  |
| ポララミン        | 5mg   | 1 A                   |                                |                  |
| 生食           | 50ml  | 1 本                   |                                |                  |
|              | 主管①   | 点滴                    | 15 分                           |                  |
| 3) アービタックス   |       | 500 mg/m <sup>2</sup> |                                |                  |
| 生食           | 250ml | 1 袋                   |                                |                  |
|              | 主管②   | 点滴                    | 初回2時間                          |                  |
|              |       |                       | 2回目以降は1時間(600mgを超える場合は90分)[*1] |                  |
| 4) 生食        | 50ml  | 1 本                   |                                |                  |
|              | 主管③   | 点滴                    | 1時間                            | 経過観察(2回目以降は15分で) |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml  | 1 筒                   |                                |                  |
|              |       |                       |                                | ルートロック           |

〈所要時間 約2時間〉

(初回 約3時間30分)