

|           |                     |    |
|-----------|---------------------|----|
| レジメンcode: | C50-30              | 備考 |
| 適応がん種:    | 乳癌                  |    |
| レジメン名:    | Pertuzumab+HER+wPTX |    |
| 間隔:       | 3週間                 |    |

| 略名  | 抗がん剤(採用薬品名)         | 投与量 | 単位                | 投与法          | 投与日     |
|-----|---------------------|-----|-------------------|--------------|---------|
|     | パージェタ(初回)           | 840 | mg/body           | 点滴(1時間)      |         |
|     | (2回目以降)             | 420 | mg/body           | 点滴(30分まで短縮可) | d1      |
| HER | トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回) | 8   | mg/kg             | 点滴(90分)      |         |
|     | (2回目以降)             | 6   | mg/kg             | 点滴(30分)      | d1      |
| PTX | パクリタキセル(タキソール)      | 80  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(1時間)      | d1、8、15 |

day1【ケモセーフ使用】

- 
- 1) 生食 20ml 1 A  
ポート確認
- 
- 2) 生食 50ml 1 本  
ルート確保
- 
- 3) パージェタ 初回 840mg/body  
2回目以降 420mg/body  
生食 250ml 1 袋  
主管① 点滴 1時間 2回目以降は30分まで短縮可能
- 
- 4) 生食 50ml 1 本  
主管② 点滴 30分(初回 1時間) 経過観察
- 
- 5) トラスツズマブ(ハーセプチン) 初回 8mg/kg  
2回目以降 6mg/kg  
注射用水 100ml 1 本 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。  
生食 100ml 1 本 21mg/mlの溶解液になる。  
主管③ 点滴 30分(初回 90分)
- 
- 6) ガスター 20mg 1 A  
デキサート 6.6mg 1 V  
デキサート 3.3mg 1 A  
ポララミン 5mg 1 A  
生食 50ml 1 本  
主管④ 点滴 15分
- 
- 7) 生食 50ml 1 本  
主管⑤ 点滴 30分

次ページあり

|                   |       |                      |                  |
|-------------------|-------|----------------------|------------------|
| 8) パクリタキセル(タキソール) |       | 80 mg/m <sup>2</sup> | <b>【ケモセーフ使用】</b> |
| ブドウ糖液5%           | 250ml | 1 袋                  |                  |
|                   | 主管⑥   | 点滴                   | 1時間 インラインフィルター必須 |
| 9) 生食             | 50ml  | 1 本                  | フラッシュ            |
| 10) ヘパリンNaロック     | 10ml  | 1 筒                  | ルートロック           |

〈所要時間 約4時間〉

〈初回 約6時間〉

day8、15【ケモセーフ使用】

|                   |       |                      |                  |
|-------------------|-------|----------------------|------------------|
| 1) 生食             | 20ml  | 1 A                  | ポート確認            |
| 2) ガスター           | 20mg  | 1 A                  |                  |
| デキサート             | 6.6mg | 1 V                  |                  |
| デキサート             | 3.3mg | 1 A                  |                  |
| ポララミン             | 5mg   | 1 A                  |                  |
| 生食                | 50ml  | 1 本                  |                  |
|                   | 主管①   | 点滴                   | 15 分             |
| 3) 生食             | 50ml  | 1 本                  |                  |
|                   | 主管②   | 点滴                   | 30 分             |
| 4) パクリタキセル(タキソール) |       | 80 mg/m <sup>2</sup> | <b>【ケモセーフ使用】</b> |
| ブドウ糖液5%           | 250ml | 1 袋                  |                  |
|                   | 主管③   | 点滴                   | 1時間 インラインフィルター必須 |
| 5) 生食             | 50ml  | 1 本                  | フラッシュ            |
| 6) ヘパリンNaロック      | 10ml  | 1 筒                  | ルートロック           |

〈所要時間 約2時間30分〉