

レジメンcode:	C03-12
適応がん種:	頭頸部癌
レジメン名:	Cet+5-FU+CBDCA
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Cet	アービタックス(初回)	400	mg/m ²	点滴(2時間)	
	(2回目以降)	250	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	1000	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~4

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) アービタックス	初回	400 mg/m ²		
	2回目以降	250 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	初回2時間	
			2回目以降1時間	
4) 生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	1時間	経過観察(2回目以降は15分で)
5) カルボプラチン(パラプラチン)		5 AUC		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋		
	主管④	点滴	1時間	
6) フルオロウラシル(5-FU)		1000 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋		
	主管⑤	点滴	24時間	

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day2~4【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分
2) フルオウラシル(5-FU)		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day5

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 ー〉

day8、15

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) アービタックス		250 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	1時間
4) 生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	15分 経過観察
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約2時間〉

次ページあり

5-FU+CBDCA終了後のGet単剤

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) アービタックス			250 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	
4) 生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	15分	経過観察
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約2時間〉