

レジメンcode:	C50-20
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	AC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	60	mg/m ²	点滴(全開)	d1
CPA	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴(1時間)	d1

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1	A	
				ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1	V	ドキシソルビシンの投与1時間～1時間30分前に アプレピタント(イメド)125mg内服
デキサート	6.6mg	1	V	
デキサート	3.3mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15分	
3) ドキシソルビシン(アドリアシン)		60	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	50ml	1	本	
	主管②	点滴	全開	
4) エンドキサン		600	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋	
	主管③	点滴	1時間	
5) 生食	50ml	1	本	フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒	ルートロック
				〈所要時間 約2時間30分〉

day2,3

アプレピタント(イメド)	80 mg
	内服 朝食後