

レジメンcode:	C35-27
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CDDP+DOC+RT
間隔:	6週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1、8、29、36
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1、8、29、36
RT		2	Gy	計 60Gy	

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1、8、29、36【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A		
生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴	2時間		
2) 生食	500ml		1 袋		
	主管②	点滴	2時間		
3) パロノセトロン	0.75mg		1 V		
デキサート	6.6mg		1 V		
デキサート	3.3mg		1 A		
生食	50ml		1 本		
	主管③	点滴	15 分		
4) ドセタキセル(タキソテル)			40 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml		1 袋		
	主管④	点滴	1時間		
5) シスプラチン(プリプラチン)			40 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製			
	主管⑤	点滴	2時間		
6) マンニトールS	300ml		1 袋		
	主管⑥	点滴	1時間		
7) ラクテック	500ml		1 袋		
	主管⑦	点滴	2時間		
8) ラクテック	500ml		1 袋		
	主管⑧	点滴	2時間		
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		

ルートロック

〈所要時間 約13時間〉

次ページあり

day2、9、30、37

---

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ラクテック	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
<hr/>			
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
<hr/>			
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約5時間〉

day3、10、31、38

---

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ラクテック	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
<hr/>			
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間

〈所要時間 約5時間〉