

レジメンcode:	C50-14
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	CMF
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPA	エンドキサン	100	mg/m ²	内服(1日1回朝食後)	d1~14
MTX	メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	600	mg/m ²	点滴(全開で)	d1、8

day1、8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) メソトレキセート		40 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30分	
4) フルオロウラシル(5-FU)		600 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	全開で	
5) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
6) ヘパフラッシュ	10ml	1 筒		
				ルートロック
				〈所要時間 約2時間〉

day1~14

1) エンドキサン		100 mg/m ²		
	内服		1日1回朝食後	