

レジメンcode:	C53-04
適応がん種:	子宮頸癌
レジメン名:	CPT-11+NDP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	60	mg/m ²	点滴(90分)	d1.8
NDP	アクブラ	80~100	mg/m ²	点滴(1時間)	d1

day1 【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1	V	
デキサート	6.6mg	1	V	
デキサート	3.3mg	1	A	
ブスコパン	20mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15分	
2) イリノテカン(トポテシン)		60	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1	袋	
	主管②	点滴	90分	
3) アクブラ		80~100	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1	袋	
	主管③	点滴	1時間	
4) ソルデム3A	500ml	1	本	
	主管④	点滴	90分	

〈所要時間 約4時間30分〉

次ページあり

day8 【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg		1 V
デキサート	6.6mg		1 V
デキサート	3.3mg		1 A
ブスコパン	20mg		1 A
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分

2) イリノテカン(トポテシン)			60 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml		1 袋
	主管②	点滴	90分

3) 生食	50ml		1 本
-------	------	--	-----

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉