

レジメンcode:	C35-18
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CPT-11+TS-1
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	80	mg/m ²	点滴(90分)	d1、15
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1~14

day1、15【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 1) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| ブスコパン | 20mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) イリノテカン(トポテシン) | | 80 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 90分 |
| 3) 生食 | 50ml | 1 本 | |

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day1~14

- | | |
|------------|---------|
| 1) ティーエスワン | [*] mg |
| | 内服 朝夕食後 |

[*]

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25~1.5m ² 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m ² 以上	60mg/回 【120mg/日】

項目	TS-1休止基準	TS-1再開基準	CPT-11実施基準
白血球	2000/mm ³ 未満	3000/mm ³ 以上	3000/mm ³ 以上
好中球	1000/mm ³ 未満	1500/mm ³ 以上	1500/mm ³ 以上
血小板	75000/mm ³ 未満	100000/mm ³ 以上	100000/mm ³ 以上
ヘモグロビン	8.0g/dL以下	8.0g/dL以上	