

レジメンcode:	C50-06
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	EC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
EPI	エピルビシン(ファルモルピシン)	90	mg/m ²	点滴(全開で)	d1
CPA	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴(1時間)	d1

★EPI 総投与量 900mg/m²以下

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	エピルビシンの投与1時間～1時間30分前に アプレピタント(イメド) 125mg内服
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) エピルビシン(ファルモルピシン)		90 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
	主管②	点滴	全開で
4) エンドキサン		600 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約2時間30分〉

day2,3

アプレピタント(イメド)	80 mg
	内服 朝食後