

| | |
|-----------|----------|
| レジメンcode: | C57-01 |
| 適応がん種: | 絨毛癌 |
| レジメン名: | EMA-CO療法 |
| 間隔: | 2週間 |

| |
|----|
| 備考 |
|----|

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-------|-------------|-----|-------------------|----------|------|
| MTX | メソトレキセート | 100 | mg/m ² | 点滴(1時間) | d1 |
| MTX | メソトレキセート | 200 | mg/m ² | 点滴(12時間) | d1 |
| VP-16 | エトポシド(ヘプシト) | 100 | mg/m ² | 点滴(2時間) | d1.2 |
| ACT-D | コスメゲン | 0.5 | mg/body | 点滴(15分) | d1.2 |
| CPA | エンドキサン | 600 | mg/m ² | 点滴(1時間) | d8 |
| VCR | オンコビン | 1 | mg/m ² | 点滴(15分) | d8 |

day1 【ケモセーフ使用】

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------|
| 1) メイロン7% | 20ml | 1 A | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間30分 |
| 2) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | ▶側管① | 点滴 | 15分 |
| 3) エトポシド(ヘプシト) | | 100 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 |
| 4) メイロン7% | 20ml | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 5時間 |
| 5) コスメゲン | | 0.5 mg/body | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15分 |
| 6) メソトレキセート | | 100 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | ▶側管③ | 点滴 | 1時間 |

次ページあり

7) メソトレキセート 200 mg/m² 【ケモセーフ使用】

生食 250ml 1 袋
▶側管④ 点滴 12時間

8) メイロン7% 20ml
ソルデム3A 500ml 1 本
主管④ 点滴 6時間30分

9) メイロン7% 20ml
ソルデム3A 500ml 1 本
主管⑤ 点滴 8時間

〈所要時間 -〉

次ページあり

| | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|------------------|---------|
| 1) メイロン7% | 20ml | 1 A | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間30分 | |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 15分 | |
| 3) エトポシド(ベプシト) | | 100 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 | |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | |
| 4) メイロン7% | 20ml | | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 5時間 | |
| 5) コスメゲン | | 0.5 mg/body | 【ケモセーフ使用】 | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15分 | |
| 6) ロイコボリン | 3mg | 5 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管③ | 点滴 | 15分 | 6時間毎に投与 |
| 7) メイロン7% | 20ml | | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 6時間30分 | |
| 8) ロイコボリン | 3mg | 5 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管④ | 点滴 | 15分 | 6時間毎に投与 |
| 9) メイロン7% | 20ml | | | |
| ソルデム3A | 500ml | 1 本 | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 8時間 | |
| 10) ロイコボリン | 3mg | 5 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管⑤ | 点滴 | 15分 | 6時間毎に投与 |

〈所要時間 -〉

次ページあり

day3

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 1) ロイコボリン | 3mg | 5 A |
|-----------|-----|-----|

生食 50ml 1本
▶側管① 点滴 15分 6時間毎に投与

2) ヘパリンNaロック

ルートロック

〈所要時間 〉

day8 【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン 0.75mg 1V
デキサート 6.6mg 1V
デキサート 3.3mg 1A
生食 50ml 1本
主管① 点滴 15分

2) エンドキサン 600 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 250ml 1袋
主管② 点滴 1時間

3) オンコビン 1 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 50ml 1本
主管③ 点滴 15分

4) 生食 50ml 1本
ルートフラッシュ

〈所要時間 約2時間〉