

レジメンcode:	C65-01
適応がん種:	上部尿路癌
レジメン名:	GC
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1、8、15
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d2

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

day1、8、15【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉

day2【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
2) 生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
3) ホスアプレピタント	150mg	1 V	
生食	100ml	1 本	
	▶側管①	点滴	30分 主管②開始60分後から
4) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管②	点滴	15分 側管①に続いて
5) シスプラチン(ブリプラチン)		70 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管③	点滴	2時間
6) マンニトールS	300ml	1 袋	
	主管④	点滴	1時間
7) ソルラクト	1L	1 袋	
	主管⑤	点滴	3時間
8) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管⑥	点滴	90分
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	

ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

day3、4

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15分
2) 硫酸Mg補正液		1 A	
ソルラクト	1L	1 袋	
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉