

レジメンcode:	C50-17
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	PTX+GEM
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
GEM	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) ガスター	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	3 V		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) グラニセトロン	3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
4) パクリタキセル(タキソール)		175 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	3時間	インラインフィルター必須
5) ゲムシタビン		1250 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本		
	主管④	点滴	30 分	
6) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約5時間〉

次ページあり

day8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) ゲムシタビン		1250 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉