

レジメンcode:	C35-50
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	PEM+Gefitinib
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PEM	ペムトレキセド(アリムタ)	500	mg/m ²	点滴(10分)	d1
	ゲフィチニブ(イレッサ)	250	mg/body	内服(朝食後)	連日

ペムトレキセド(アリムタ)初回投与の1週間以上前～ペムトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで連日投与

- 1) パンビタン 1 g/day
内服 朝食後

ペムトレキセド(アリムタ)1週間以上前～ペムトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで9週ごとに1回

- 1) シアノコバラミン 1000 μg 1 A
筋注

day1【ケモセーフ使用】

- 1) デキサート 6.6mg 1 V
生食 50ml 1 本
主管① 点滴 15 分
- 2) ペムトレキセド(アリムタ) 500 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 100ml 1 本
主管② 点滴 10分
- 3) 生食 50ml 1 本
フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉

連日

- 1) ゲフィチニブ(イレッサ) 250 mg/body
内服 朝食後