

レジメンcode:	C56-19
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	PLD+Bv
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PLD	ドキシル	40	mg/m ²	点滴(90分)[*1]	d1
Bv	アバスチン	10	mg/kg	点滴[*2]	d1、15

PLD:★総投与量 500mg/m²以下

*ドキシル

- ・[*1]投与量が90mg以上の場合は、5%ブドウ糖500mlに溶解し120分で投与。
- ・インラインフィルター使用不可
- ・慎重投与:大豆アレルギーのある患者

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|----------|-----------|----------------------|------------------------|
| 1) デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) ドキシル | | 40 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml[*1] | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 90分[*1] インラインフィルター使用不可 |
| 3) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | | 15分 |
| 4) アバスチン | | 10 mg/kg | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 初回90分 |
| | | | 2回目60分 |
| | | | 3回目以降30分[*2] |
| 5) 生食 | 50ml | 1 本 | |

フラッシュ

投与量90mg未満の場合:〈所要時間 約3時間〉
 〈2回目 約3時間30分〉
 〈初回 約4時間〉

次ページあり

day15

1) 生食	50ml	1 本	
			ルート確保
2) アバスチン		10 mg/kg	
生食	100ml	1 本	
	主管①	点滴	2回目60分
			3回目以降30分[*2]
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉
〈2回目 約1時間30分〉