

レジメンcode:	C50-23
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	PTX+Bev
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与方法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15
Bev	ペバシズマブ(アバスタ)	10	mg/kg	点滴[*1]	d1、15

day1、15【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) ガスター	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
4) パクリタキセル(タキソール)		80 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
5) 生食	50ml	1 本		
	主管④	点滴	15分	
6) ペバシズマブ(アバスタ)		10 mg/kg		
生食	100ml	1 本		
	主管⑤	点滴	初回90分	
			2回目60分	
			3回目以降30分[*1]	
7) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約3時間〉

〈2回目 約3時間30分〉

〈初回 約4時間〉

次ページあり

day8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) ガスター	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
4) パクリタキセル(タキソール)		80 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
5) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約2時間30分〉