

レジメンcode:	C99-08
適応がん種:	骨髄異形成症候群
レジメン名:	ビダーザ(点滴静注)
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	ビダーザ	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴(10分)	d1~7

day1~6【ケモセーフ使用】

- |            |       |     |                   |                   |
|------------|-------|-----|-------------------|-------------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg   | 1   | A                 |                   |
| デキサート      | 6.6mg | 1   | V                 |                   |
| 生食         | 50ml  | 1   | 本                 |                   |
|            | 主管①   | 点滴  | 15                | 分                 |
| 2) ビダーザ    |       | 75  | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】         |
| 注射用水       |       | 100 | ml                | ビダーザ溶解用           |
| 生食         | 50ml  | 1   | 本                 | 調製後1時間以内に投与終了すること |
|            | 主管②   | 点滴  | 10                | 分                 |
| 3) 生食      | 50ml  | 1   | 本                 | フラッシュ             |
| 4) ヘパフラッシュ | 10ml  | 1   | 筒                 | ルートロック            |
- 〈所要時間 約 45分〉

day7【ケモセーフ使用】

- |            |       |     |                   |                   |
|------------|-------|-----|-------------------|-------------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg   | 1   | A                 |                   |
| デキサート      | 6.6mg | 1   | V                 |                   |
| 生食         | 50ml  | 1   | 本                 |                   |
|            | 主管①   | 点滴  | 15                | 分                 |
| 2) ビダーザ    |       | 75  | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】         |
| 注射用水       |       | 100 | ml                | ビダーザ溶解用           |
| 生食         | 50ml  | 1   | 本                 | 調製後1時間以内に投与終了すること |
|            | 主管②   | 点滴  | 10                | 分                 |
| 3) 生食      | 50ml  | 1   | 本                 | フラッシュ             |
- 〈所要時間 約 45分〉

・減量基準あり。