

レジメンcode:	C56-09
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	CPT-11 (A法)
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(90分)	d1、8、15

day1、8、15 【ケモセーフ使用】

- |                  |        |     |                   |           |
|------------------|--------|-----|-------------------|-----------|
| 1) パロノセトロン       | 0.75mg | 1   | V                 |           |
| デキサート            | 6.6mg  | 1   | V                 |           |
| デキサート            | 3.3mg  | 1   | A                 |           |
| ブスコパン            | 20mg   | 1   | A                 |           |
| 生食               | 50ml   | 1   | 本                 |           |
|                  | 主管①    | 点滴  | 15                | 分         |
| <hr/>            |        |     |                   |           |
| 2) イリノテカン(トポテシン) |        | 100 | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5%          | 500ml  | 1   | 袋                 |           |
|                  | 主管②    | 点滴  | 90                | 分         |
| <hr/>            |        |     |                   |           |
| 3) 生食            | 50ml   | 1   | 本                 |           |
|                  |        |     |                   | フラッシュ     |

〈所要時間 約2時間30分〉