

レジメンcode:	C25-10
適応がん種:	膵癌
レジメン名:	modified FOLFIRINOX-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)[*]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m <sup>2</sup>	点滴(46時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴	30分		
3) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
ブスコパン	20mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	15分		
4) オキサリプラチン(エルプラット)		85 mg/m <sup>2</sup>			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管③	点滴	2時間		
5) イリノテカン(トポテシン)		150 mg/m <sup>2</sup>			【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋			
	主管④	点滴	2時間		
6) レボホリナート		200 mg/m <sup>2</sup>			
生食	250ml	1 袋			
	▶側管①	点滴	2時間	主管④と同時に[*]	
7) 生食	50ml	1 本			
	主管⑤			フラッシュ	
8) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m <sup>2</sup>			
生食	100ml	総液量140ml になるように調製			
	主管⑥	点滴	46時間		
			(インフューザー)		

〈所要時間 ー〉

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
				ルートロック	

〈所要時間 ー〉