

レジメンcode:	C50-08
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	VNR+HER
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VNR	ロゼウス(ナバルピン)	25	mg/m ²	点滴(全開で)	d1、8
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	4	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	2	mg/kg	点滴(30分)	d1、8、15

day1、8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml		1 A		
				ポート確認	
2) デキサート	6.6mg		1 V		
生食	50ml		1 本		
	主管①	点滴	15分		
3) ロゼウス(ナバルピン)			25 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	50ml		20 ml		
	主管②	点滴	全開で	生食50mlから30ml抜いたボトルにVNR混注	
4) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	4mg/kg		
		2回目以降	2mg/kg		
注射用水	100ml		1 本	60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。	
生食	100ml		1 本	21mg/mlの溶解液になる。	
	主管③	点滴	30 分 (初回 90分)		
5) 生食	50ml		1 本		
				フラッシュ	
6) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約1時間30分〉

次ページあり

〈初回 約2時間30分〉

day15

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) 生食	50ml	1 本	
			ルート確保
3) トラスツズマブ(ハーセプチン)		2 mg/kg	
注射用水	100ml	1 本	60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml	1 本	21mg/mlの溶解液になる。
	主管①	点滴	30分
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間〉