

レジメンcode:	C50-26	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	weekly nab-PTX+HER	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Nab-PTX	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1、8、15
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	4	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	2	mg/kg	点滴(30分)	d1、8、15、22

day1、8、15【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml		1 A		
				ポート確認	
2) デキサート	6.6mg		1 V		
生食	50ml		1 本		
	主管①	点滴	15 分		
3) 生食	50ml		1 本		
	主管②	点滴	15 分		
4) アブラキサン			100 mg/m <sup>2</sup>	<b>【ケモセーフ使用】</b>	
生食	100ml		1 本	(5mg/mLになるように調製)	
	主管③	点滴	30 分	インラインフィルター使用不可	
5) 生食	50ml		1 本		
	主管④	点滴	15 分		
6) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	4mg/kg		
		2回目以降	2mg/kg		
注射用水	100ml		1 本	60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。	
生食	100ml		1 本	21mg/mlの溶解液になる。	
	主管⑤	点滴	30 分	(初回 90分)	
7) 生食	50ml		1 本		
				フラッシュ	
8) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約3時間30分〉

次ページあり

day22

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) 生食	50ml	1 本	
			ルート確保
3) トラスツズマブ(ハーセプチン)		2 mg/kg	
注射用水	100ml	1 本	60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml	1 本	21mg/mlの溶解液になる。
	主管①	点滴	30 分
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間〉

・特定生物由来製品

医薬品名(販売名)、その製造番号又は製造記号(ロット番号)、使用年月日、使用した患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること

・インラインフィルター使用不可