

レジメンcode:	C18-43
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+IRIS
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与方法	投与日
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1、15
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	100	mg/m ²	点滴(90分)	d1、15
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~15朝

day1、15【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|------------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | | |
| | | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | | ルート確保 |
| 3) ベバシズマブ(アバスタ) | | 5 mg/kg | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | | 初回90分 |
| | | | | 2回目60分 |
| | | | | 3回目以降30分[*1] |
| 4) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | | |
| ブスコパン | 20mg | 1 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 15 分 | |
| 5) イリノテカン(トポテシン) | | 100 mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 90分 | |
| 6) 生食 | 50ml | 1 本 | | フラッシュ |
| 7) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | | ルートロック |

〈所要時間 約3時間〉
 〈2回目 約3時間30分〉
 〈初回 約4時間〉

day1夕~15朝

- | | |
|------------|---------|
| 1) ティーエスワン | [*] mg |
| | 内服 朝夕食後 |

【*】

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25~1.5m ² 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m ² 以上	60mg/回 【120mg/日】