

レジメンcode:	C50-22
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	Eribulin療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴(全開)	d1、8

day1、8【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) デキサート	6.6mg	1 V			
生食	50ml	1 本			
	主管①	点滴	15 分		
3) ハラヴェン		1.4 mg/m ²		【ケモセーフ使用】	
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	全開		
4) 生食	50ml	1 本			
				フラッシュ	
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
				ルートロック	
					〈所要時間 約1時間〉

- * DLT: 好中球減少症および発熱性好中球減少症。減量を行う際、下記の用量を参考にすること。
- * QT間隔延長があらわれたとの報告があるので、投与開始前は心電図検査及び電解質検査を行うこと。
- * 5%ブドウ糖希釈不可。生理食塩水を用いて希釈すること。0.01mg/ml未満の濃度に希釈しないこと。
- * 1バイアル(1mg/2ml)中に5%無水エタノールを0.1ml含有。

減量前の投与量	→	減量後の投与量
1.4mg/m ²	→	1.1mg/m ²
1.1mg/m ²	→	0.7mg/m ²
0.7mg/m ²	→	投与中止を考慮