

レジメンcode:	C50-35	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	nab-PTX+3wHER	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
nab-PTX	アブラキサン	260	mg/m ²	点滴(30分)	d1
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	d1
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	15 分	
4) アブラキサン		260 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本		(5mg/mLになるように調製)
	主管③	点滴	30 分	インラインフィルター使用不可
5) 生食	50ml	1 本		
	主管④	点滴	15 分	
6) トラスツズマブ(ハーセプチン)		初回	8mg/kg	
		2回目以降	6mg/kg	
注射用水	100ml	1 本		60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。
生食	100ml	1 本		21mg/mlの溶解液になる。
	主管⑤	点滴	30 分 (初回 90分)	
7) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約3時間30分〉

* アブラキサン

・特定生物由来製品

医薬品名(販売名)、その製造番号又は製造記号(ロット番号)、使用年月日、使用した患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること

・インラインフィルター使用不可