

レジメンcode:	C15-13
適応がん種:	食道癌
レジメン名:	Pembrolizumab+5-FU
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴(30分)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~5

day1【ケモセーフ使用】

- |                   |        |                       |      |              |
|-------------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 1) 生食             | 20ml   | 1 A                   |      |              |
|                   |        |                       |      | ポート確認        |
| 2) 生食             | 50ml   | 1 本                   |      | ルート確保        |
| 3) キイトルーダ         |        | 200 mg/body           |      |              |
| 生食                | 50ml   | 1 本                   |      |              |
|                   | 主管①    | 点滴                    | 30分  | インラインフィルター必須 |
| 4) 生食             | 50ml   | 1 本                   |      |              |
|                   | 主管②    | 点滴                    | 15分  |              |
| 5) デキサート          | 6.6mg  | 1 V                   |      |              |
| 生食                | 50ml   | 1 本                   |      |              |
|                   | 主管③    | 点滴                    | 15 分 |              |
| 6) フルオロウラシル(5-FU) |        | 800 mg/m <sup>2</sup> |      | 【ケモセーフ使用】    |
| 生食                | 1000ml | 1 袋                   |      |              |
|                   | 主管④    | 点滴                    | 24時間 |              |

〈所要時間 ー〉

day2~5【ケモセーフ使用】

- |                   |        |                       |      |           |
|-------------------|--------|-----------------------|------|-----------|
| 1) デキサート          | 6.6mg  | 1 V                   |      |           |
| 生食                | 50ml   | 1 本                   |      |           |
|                   | ▶側管①   | 点滴                    | 15 分 |           |
| 2) フルオロウラシル(5-FU) |        | 800 mg/m <sup>2</sup> |      | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食                | 1000ml | 1 袋                   |      |           |
|                   | 主管①    | 点滴                    | 24時間 | 前日の主管に続いて |

〈所要時間 ー〉

day6

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 ー〉

#### 【文献】

国際共同第Ⅲ相試験(KEYNOTE-590試験)Lancet 2021;398:759-71(PMID:34454674)

#### 【キイトルーダ】

\*インラインフィルター(0.2~5 $\mu$ m)を使用する。

\*調製時、又は希釈後に振盪により微粒子が生成される可能性があるため、バイアルは振盪せず、激しく攪拌しない。

\*希釈後の最終濃度1~10mg/mlとする。

\*生食又は5%ブドウ糖に溶解する。同一点滴ラインを使用して他の薬剤を併用同時投与しない。

\*希釈後、25℃以下で6時間以内または2~8℃で合計96時間以内に使用する。

\*有害事象(肺、肝、内分泌障害、皮膚、胃腸、腎、神経関連など)対処アルゴリズムを参照する。

\*臨床試験での検査スケジュール、投与延期または休薬基準を参照する。