

レジメンcode:	C35-39
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	Ramucirumab+DOC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
RAM	サイラムザ	10	mg/kg	点滴[*1]	d1
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	60	mg/m ²	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) グラニセロン	3mg	1	A	
デキサート	6.6mg	1	V	
ポラミン	5mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15分	
2) サイラムザ		10 mg/kg		インラインフィルター必須
生食	250ml	全量250mLになるように生食調製		
	主管②	点滴	初回60分	
			2回目以降30分[*1]	
3) 生食	50ml	1	本	
	主管③	点滴	15分	
4) ドセタキセル(タキソテル)		60 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋	
	主管④	点滴	1時間	
5) 生食	50ml	1	本	
			フラッシュ	

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約3時間〉

(サイラムザ)

*蛋白尿があらわれることがあるので、本剤投与中は蛋白尿を定期的に検査すること(減量基準あり)

*infusion reactionがあらわれることあり

・grade3、4 → 本剤の投与を直ちに中止し、再投与しないこと

・grade1、2 → 投与速度を50%減速し、その後の全ての投与においても減速した投与速度で投与すること

*インラインフィルター使用必須