

| | |
|-----------|--------|
| レジメンcode: | C56-23 |
| 適応がん種: | 卵巣癌 |
| レジメン名: | wPTX |
| 間隔: | 3週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-----|----------------|-------|-------------------|---------|---------|
| PTX | パクリタキセル(タキソール) | 60~80 | mg/m ² | 点滴(1時間) | d1、8、15 |

day1、8、15【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 | A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 | V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 | A | |
| ポララミン | 5mg | 1 | A | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 | 分 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 | 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 60~80 | mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 | 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 | インラインフィルター必須 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | | | | フラッシュ |

〈所要時間 約2時間30分〉