

レジメンcode:	C56-22
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	wPTX+Bv
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	60~70	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15、22
Bv	アバスタチン	10	mg/kg	点滴[*1]	d1、15

day1、15【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg	1	A	
デキサート	6.6mg	1	V	
デキサート	3.3mg	1	A	
ポララミン	5mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15分	
2) 生食	50ml	1	本	
	主管②	点滴	30分	
3) パクリタキセル(タキソール)	60~70 mg/m ²			【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋	
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1	本	
	主管④	点滴	15分	
5) アバスタチン	10 mg/kg			
生食	100ml	1	本	
	主管⑤	点滴	初回90分	
			2回目60分	
			3回目以降30分[*1]	
6) 生食	50ml	1	本	
			フラッシュ	

〈所要時間 約3時間〉
 〈2回目 約3時間30分〉
 〈初回 約4時間〉

次ページあり

day8、22 【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg		1 A	
デキサート	6.6mg		1 V	
デキサート	3.3mg		1 A	
ポララミン	5mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管①	点滴	15 分	
<hr/>				
2) 生食	50ml		1 本	
	主管②	点滴	30 分	
<hr/>				
3) パクリタキセル(タキソール)		60~70 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml		1 袋	
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
<hr/>				
4) 生食	50ml		1 本	
				フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉