

レジメンcode:	C35-29
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	wPTX+wCBDCA+RT
間隔:	1週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	40	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	2	AUC	点滴(1時間)	d1
RT		2	Gy	計 60Gy	

*化学放射線療法(6コース)終了後、CBDCA(AUC5)+PTX(200mg/m²) day1 3週ごと 2サイクルを追加

day1【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg	1	A	
デキサート	6.6mg	1	V	
デキサート	3.3mg	1	A	
ポララミン	5mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15	分
2) パロノセトロン	0.75mg	1	V	
生食	50ml	1	本	
	主管②	点滴	30	分
3) パクリタキセル(タキソール)		40	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋	
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
4) カルボプラチン(パラプラチン)		2	AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋	
	主管④	点滴	1時間	
5) 生食	50ml	1	本	

フラッシュ

〈所要時間 約3時間30分〉