

レジメンcode:	C53-01
適応がん種:	子宮頸癌
レジメン名:	CDDP+RT
間隔:	1週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	40	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
RT		45~50.4	Gy	全骨盤照射(1回1.8~2.0Gy)	
RT		12~24	Gy	腔内照射(2~4回分割)	

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液		1	A
生食	500ml	1	袋
	主管①	点滴	2時間
2) 生食	500ml	1	袋
	主管②	点滴	2時間
3) アロカリス	235mg	1	V
パロノセトロン	0.75mg	1	V
デキサート	6.6mg	1	V
デキサート	3.3mg	1	A
生食	50ml	1	本
	主管③	点滴	30分
4) シスプラチン(プリプラチン)		40	mg/m ² 【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	2時間
5) マンニトールS	300ml	1	袋
	主管⑤	点滴	1時間
6) ラクテック	500ml	1	袋
	主管⑥	点滴	2時間
7) ラクテック	500ml	1	袋
	主管⑦	点滴	2時間
8) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒

ルートロック

〈所要時間 約12時間〉

次ページあり

day2

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ラクテック	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約5時間〉

day3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ラクテック	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間

〈所要時間 約5時間〉