

レジメンcode:	C54-02
適応がん種:	子宮体部癌
レジメン名:	DOC+CDDP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	70	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	60	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A	
生食	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	2時間	
2) 生食	500ml		1 袋	
	主管②	点滴	2時間	
3) アロカリス	235mg		1 V	
パロノセトロン	0.75mg		1 V	
デキサート	6.6mg		1 V	
デキサート	3.3mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管③	点滴	30 分	
4) ドセタキセル(タキソテル)			70 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml		1 袋	
	主管④	点滴	1時間	
5) ラクテック	500ml		1 袋	
	主管⑤	点滴	90 分	
6) シスプラチン(プリプラチン)			60 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml		総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管⑥	点滴	2時間	
7) マンニトールS	300ml		1 袋	
	主管⑦	点滴	1時間	
8) ソルラクト	1L		1 袋	
	主管⑧	点滴	3時間	
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒	

ルートロック

次ページあり

〈所要時間 約13時間30分〉

day2、3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
<hr/>			
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
<hr/>			
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉