

レジメンcode:	C35-02
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CDDP+VNR
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VNR	ロゼウス(ナベルビン)	25	mg/m ²	点滴(全開で)	d1、8
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A		
生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴		2時間	
2) 生食	500ml		1 袋		
	主管②	点滴		2時間	
3) アロカリス	235mg		1 V		
パロノセトロン	0.75mg		1 V		
デキサート	6.6mg		1 V		
デキサート	3.3mg		1 A		
生食	50ml		1 本		
	主管③	点滴		30 分	
4) ロゼウス(ナベルビン)			25 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	50ml		20 ml		
	主管④	点滴		全開で	生食50mlから30ml抜いたボトルにVNR混注
5) 生食	250ml		1 本		ロゼウス投与終了後、速やかに開始
	主管⑤	点滴		全開で	フラッシュ
6) ラクテック	500ml		1 袋		
	主管⑥	点滴		90 分	
7) シスプラチン(プリプラチン)			80 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml				総液量650ml以下になるように生食を調製
	主管⑦	点滴		2時間	
8) マンニトールS	300ml		1 袋		
	主管⑧	点滴		1時間	
9) ソルラクト	1L		1 袋		
	主管⑨	点滴		3時間	
10) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒		
					ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

次ページあり

day2、3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) ロゼウス(ナベルビン)			25 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
生食	50ml		20 ml
	主管②	点滴	全開で 生食50mlから30ml抜いたボトルにVNR混注
3) 生食	250ml		1 本
			ロゼウス投与終了後、速やかに開始
			全開で フラッシュ

〈所要時間 約1時間30分〉