

レジメンcode:	C54-03
適応がん種:	子宮体部癌
レジメン名:	ADM+CDDP
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開で)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1

★ADM 総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- |                     |        |                       |           |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------|
| 1) 硫酸Mg補正液          |        | 1 A                   |           |
| 生食                  | 500ml  | 1 袋                   |           |
|                     | 主管①    | 点滴                    | 2時間       |
| 2) 生食               | 500ml  | 1 袋                   |           |
|                     | 主管②    | 点滴                    | 2時間       |
| 3) アロカリス            | 235mg  | 1 V                   |           |
| パロノセトロン             | 0.75mg | 1 V                   |           |
| デキサート               | 6.6mg  | 1 V                   |           |
| デキサート               | 3.3mg  | 1 A                   |           |
| 生食                  | 50ml   | 1 本                   |           |
|                     | 主管③    | 点滴                    | 30 分      |
| 4) ドキシソルビシン(アドリアシン) |        | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食                  | 50ml   | 1 本                   |           |
|                     | 主管④    | 点滴                    | 全開        |
| 5) シスプラチン(プリプラチン)   |        | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食                  | 500ml  | 総液量650ml以下になるように生食を調製 |           |
|                     | 主管⑤    | 点滴                    | 2時間       |
| 6) マンニトールS          | 300ml  | 1 袋                   |           |
|                     | 主管⑥    | 点滴                    | 1時間       |
| 7) ラクテック            | 500ml  | 1 袋                   |           |
|                     | 主管⑦    | 点滴                    | 90分       |
| 8) ソラクト             | 1L     | 1 袋                   |           |
|                     | 主管⑧    | 点滴                    | 3時間       |
| 9) ヘパリンNaロック        | 10ml   | 1 筒                   |           |

ルートロック

〈所要時間 約13時間〉

次ページあり

day2、3

---

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
<hr/>			
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
<hr/>			
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉