

レジメンcode:	C80-02
適応がん種:	神経内分泌細胞癌(小細胞癌)
レジメン名:	CBDCA+VP-16
間隔:	3~4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VP-16	エトポシド	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1~3
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1	V	エトポシドの投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イメド) 125mg内服
デキサート	3.3mg	1.5	A	
生食	50ml	1	本	
主管①	点滴	15	分	
2) エトポシド		80	mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1	袋	
主管②	点滴	2	時間	
3) カルボプラチン(パラプラチン)		5	AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋	
主管③	点滴	1	時間	
4) 生食	50ml	1	本	フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒	ルートロック

〈所要時間 約4時間〉

day2、3

アプレピタント(イメド)	80 mg
内服	朝食後

次ページあり

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	3.3mg		1 A
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) エトポシド			80 mg/m <sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】
生食	500ml		1 袋
	主管②	点滴	2時間
3) 生食	50ml		1 本
			フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒
			ルートロック

〈所要時間 約3時間〉

\*適応: 神経内分泌細胞癌(小細胞癌)

2018年2月26日厚生労働省「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」の通知において、エトポシド、カルボプラチンを「神経内分泌細胞癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認めるとされている