

レジメンcode:	C80-03
適応がん種:	神経内分泌細胞癌(小細胞癌)
レジメン名:	AMR
間隔:	3~4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
AMR	カルセド	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開で)	d1~3

day1~3 **【ケモセーフ使用】**

- |              |       |     |                   |                  |
|--------------|-------|-----|-------------------|------------------|
| 1) グラニセトロン   | 3mg   | 1   | A                 |                  |
| デキサート        | 6.6mg | 1   | V                 |                  |
| デキサート        | 3.3mg | 1   | A                 |                  |
| 生食           | 50ml  | 1   | 本                 |                  |
|              | 主管①   | 点滴  | 15分               |                  |
| 2) カルセド      |       | 40  | mg/m <sup>2</sup> | <b>【ケモセーフ使用】</b> |
| 生食           | 50ml  | 1   | 本                 | 溶解後3時間以内に投与開始    |
|              | 主管②   | 点滴  | 全開で               |                  |
| 3) 生食        | 100ml | 1   | 本                 |                  |
|              | 主管③   | 全開で | フラッシュ             |                  |
| 4) ヘパリンNaロック | 10ml  | 1   | 筒                 |                  |
|              |       |     | ルートロック            |                  |

〈所要時間 約1時間〉

\* 保険適応外(2023.9月時点)だが、倫理委員会(院長決裁)にて使用可能