

| | |
|-----------|-----------|
| レジメンcode: | C35-05 |
| 適応がん種: | 非小細胞肺癌 |
| レジメン名: | CBDCA+PTX |
| 間隔: | 3~4週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-------|-----------------|-----|-------------------|---------|-----|
| PTX | パクリタキセル(タキソール) | 200 | mg/m ² | 点滴(3時間) | d1 |
| CBDCA | カルボプラチン(パラプラチン) | 6 | AUC | 点滴(1時間) | d1 |

day1【ケモセーフ使用】

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----|-------------------|---|------------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 | A | | |
| デキサート | 6.6mg | 3 | V | | |
| ポララミン | 5mg | 1 | A | | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 15 | 分 | |
| 2) アロカリス | 235mg | 1 | V | | |
| パロノセトロン | 0.75mg | 1 | V | | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 30 | 分 | |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 200 | mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | | インラインフィルター必須 |
| 4) カルボプラチン(パラプラチン) | | 6 | AUC | | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 250ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 1時間 | | |
| 5) 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | | | | | フラッシュ |

〈所要時間 約5時間30分〉