

レジメンcode:	C90-04
適応がん種:	多発性骨髄腫
レジメン名:	VMP療法
間隔:	6週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
BOR	ボルテゾミブ(ベルケイト <sup>®</sup> )(1~4クール)	1.3	mg/m <sup>2</sup>	静注	d1.4.8.11.22.25.29.32
	(5~9クール)	1.3	mg/m <sup>2</sup>	静注	d1.8.22.29
	アルケラン	9	mg/m <sup>2</sup>	内服(朝食前)	d1~4
	プレドニン	60	mg/m <sup>2</sup>	内服(朝昼食後)	d1~4

d1、4、8、11、22、25、29、32(1~4クール)

- 1) 生食 50ml 1本  
 主管 点滴 15分
- 
- 2) ボルテゾミブ(ベルケイト<sup>®</sup>) 1.3 mg/m<sup>2</sup>  
 生食 3ml 3ml/1V 溶解後必要量調製  
 ▶側管① 静注 主管の途中で
- 〈所要時間 約45分〉

d1、8、22、29(5~9クール)

- 1) 生食 50ml 1本  
 主管 点滴 15分
- 
- 2) ボルテゾミブ(ベルケイト<sup>®</sup>) 1.3 mg/m<sup>2</sup>  
 生食 3ml 3ml/1V 溶解後必要量調製  
 ▶側管① 静注 主管の途中で
- 〈所要時間 約45分〉

d1~4

- 1) アルケラン 9 mg/m<sup>2</sup>  
 内服 朝食前
- 
- 2) プレドニン 60 mg/m<sup>2</sup>  
 内服 朝昼食後

連日

- 1) バクタ 1錠/day  
 アシクロビル 200mg 1錠/day  
 内服 朝食後

ニューモシスチス肺炎、帯状疱疹の発症予防のため上記薬剤の内服が推奨されている