

レジメンcode:	C54-05
適応がん種:	子宮体癌
レジメン名:	TC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175~180	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5~6	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- |                    |        |                           |                  |
|--------------------|--------|---------------------------|------------------|
| 1) ガスター            | 20mg   | 1 A                       |                  |
| デキサート              | 6.6mg  | 3 V                       |                  |
| ポララミン              | 5mg    | 1 A                       |                  |
| 生食                 | 50ml   | 1 本                       |                  |
|                    | 主管①    | 点滴                        | 15 分             |
| 2) アロカリス           | 235mg  | 1 V                       |                  |
| パロノセトロン            | 0.75mg | 1 V                       |                  |
| 生食                 | 50ml   | 1 本                       |                  |
|                    | 主管②    | 点滴                        | 30 分             |
| 3) パクリタキセル(タキソール)  |        | 175~180 mg/m <sup>2</sup> | <b>【ケモセーフ使用】</b> |
| ブドウ糖液5%            | 500ml  | 1 袋                       |                  |
|                    | 主管③    | 点滴                        | 3時間 インラインフィルター必須 |
| 4) カルボプラチン(パラプラチン) |        | 5~6 AUC                   | <b>【ケモセーフ使用】</b> |
| 生食                 | 250ml  | 1 袋                       |                  |
|                    | 主管④    | 点滴                        | 1時間              |
| 5) 生食              | 50ml   | 1 本                       |                  |

フラッシュ

〈所要時間 約5時間30分〉