

レジメンcode:	C35-07
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CDDP+GEM
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A	
生食	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	2時間	
2) 生食	500ml		1 袋	
	主管②	点滴	2時間	
3) アロカリス	235mg		1 V	
パロノセトロン	0.75mg		1 V	
デキサート	6.6mg		1 V	
デキサート	3.3mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管③	点滴	30 分	
4) ゲムシタビン		1000 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	100ml		1 本	
	主管④	点滴	30 分	
5) ラクテック	500ml		1 袋	
	主管⑤	点滴	90 分	
6) シスプラチン(プリプラチン)		80 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	主管⑥	点滴	2時間	
7) マンニトールS	300ml		1 袋	
	主管⑦	点滴	1時間	
8) ソララクト	1L		1 袋	
	主管⑧	点滴	3時間	
9) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒	

ルートロック

〈所要時間 約13時間〉

次ページあり

day2、3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml		1 本
	主管②	点滴	30 分
3) 生食	50ml		1 本

フラッシュ

〈所要時間 約1時間30分〉