

レジメンcode:	C53-06
適応がん種:	子宮頸癌
レジメン名:	TC+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1
Bv	アバスタチン	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg	1	A		
デキサート	6.6mg	3	V		
ポララミン	5mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15	分	
2) アロカリス	235mg	1	V		
パロノセトロン	0.75mg	1	V		
生食	50ml	1	本		
	主管②	点滴	30	分	
3) パクリタキセル(タキソール)		175	mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1	袋		
	主管③	点滴	3時間		インラインフィルター必須
4) カルボプラチン(パラプラチン)		5	AUC		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋		
	主管④	点滴	1時間		
5) アバスタチン		15	mg/kg		
生食	100ml	1	本		
	主管⑤	点滴	初回90分		
			2回目60分		
			3回目以降30分[*1]		
6) 生食	50ml	1	本		
					フラッシュ

〈所要時間	約5時間30分〉
〈2回目	約6時間〉
〈初回	約6時間30分〉