

レジメンcode:	C35-12	備考
適応がん種:	非小細胞肺癌	
レジメン名:	CDDP+VNR+RT	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VNR	ロゼウス(ナベルビン)	20	mg/m ²	点滴(全開)	d1、8
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	80	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
RT		2	Gy	計 60Gy	

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 1) 硫酸Mg補正液 | | 1 A | |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間 |
| 2) 生食 | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 |
| 3) アロカリス | 235mg | 1 V | |
| パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 30 分 |
| 4) ロゼウス(ナベルビン) | | 20 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 50ml | 20 ml | |
| | 主管④ | 点滴 | 全開で 生食50mlから30ml抜いたボトルにVNR混注 |
| 5) 生食 | 250ml | 1 本 | ロゼウス投与終了後、速やかに開始 |
| | 主管⑤ | 点滴 | 全開で フラッシュ |
| 6) ラクテック | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 90 分 |
| 7) シスプラチン(プリプラチン) | | 80 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 2時間 |
| 8) マンニトールS | 300ml | 1 袋 | |
| | 主管⑧ | 点滴 | 1時間 |
| 9) ソルラクト | 1L | 1 袋 | |
| | 主管⑨ | 点滴 | 3時間 |
| 10) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |

ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

次ページあり

day2、3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒
			ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) ロゼウス(ナベルビン)			20 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
生食	50ml		20 ml
	主管②	点滴	全開で 生食50mlから30ml抜いたボトルにVNR混注
3) 生食	250ml		1 本
			ロゼウス投与終了後、速やかに開始
			全開で フラッシュ

〈所要時間 約1時間30分〉