

レジメンcode:	C35-15
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	PEM+CBDCA
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PEM	ペメトレキセド(アリムタ)	500	mg/m ²	点滴(10分)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5~6	AUC	点滴(1時間)	d1

ペメトレキセド(アリムタ)初回投与の1週間以上前~ペメトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで連日投与

- 1) パンビタン 1 g/day
内服 朝食後

ペメトレキセド(アリムタ)1週間以上前~ペメトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで9週ごとに1回

- 1) シアノコバラミン 1000 μg 1 A
筋注

day1【ケモセーフ使用】

- 1) アロカリス 235mg 1 V
パロノセトロン 0.75mg 1 V
デキサート 3.3mg 1.5 A
生食 50ml 1 本
主管① 点滴 30 分
- 2) ペメトレキセド(アリムタ) 500 mg/m² **【ケモセーフ使用】**
生食 100ml 1 本
主管② 点滴 10 分
- 3) カルボプラチン(パラプラチン) 5~6 AUC **【ケモセーフ使用】**
生食 250ml 1 袋
主管③ 点滴 1時間
- 4) 生食 50ml 1 本

フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉