

レジメンcode:	C35-16
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CBDCA+wPTX
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	70	mg/m ²	点滴(1時間)	d1.8.15
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5~6	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|--------------------|--------|-----|-------------------|------------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 | A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 | V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 | A | |
| ポララミン | 5mg | 1 | A | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 | 分 |
| 2) アロカリス | 235mg | 1 | V | |
| パロノセトロン | 0.75mg | 1 | V | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 | 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 70 | mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 | 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 | インラインフィルター必須 |
| 4) カルボプラチン(パラプラチン) | | 5~6 | AUC | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 250ml | 1 | 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 1時間 | |
| 5) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |

フラッシュ

〈所要時間 約3時間30分〉

day8、15【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg		1 A	
デキサート	6.6mg		1 V	
デキサート	3.3mg		1 A	
ポララミン	5mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管①	点滴	15 分	
2) 生食	50ml		1 本	
	主管②	点滴	30 分	
3) パクリタキセル(タキソール)			70 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml		1 袋	
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
4) 生食	50ml		1 本	
				フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉