

レジメンcode:	C35-17
適応がん種:	非小細胞癌
レジメン名:	TS-1 + CDDP+RT
間隔:	6週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1~d14、d29~d42
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	60	mg/m ²	点滴(2時間)	d1、29
RT		2	Gy	計 60Gy	

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1、29【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
3) 生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
4) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	30 分
5) シスプラチン(プリプラチン)		60 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	2時間
6) マンニトールS	300ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	1時間
7) ソルラクト	1L	1 袋	
	主管⑥	点滴	3時間
8) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管⑦	点滴	90 分
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

次ページあり

day2、3、30、31

1) 生食	20ml		1 A
ポート確認			
2) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
3) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
4) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
5) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒
ルートロック			

〈所要時間 約7時間〉

day1～14、29～42

1) ティーエスワン	[*] mg
	内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 25㎡未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25～1.5㎡未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5㎡以上	60mg/回 【120mg/日】