

レジメンcode:	C35-21
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	PEM+CBDCA+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PEM	ペムトレキセド(アリムタ)	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴(10分)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	6	AUC	点滴(1時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

ペムトレキセド(アリムタ)初回投与の1週間以上前～ペムトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで連日投与

- 1) パンビタン 1 g/day  
内服 朝食後

ペムトレキセド(アリムタ)1週間以上前～ペムトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで9週ごとに1回

- 1) シアノコバラミン 1000 μg 1 A  
筋注

day1【ケモセーフ使用】

- 1) アロカリス 235mg 1 V  
パロノセトロン 0.75mg 1 V  
デキサート 3.3mg 1.5 A  
生食 50ml 1 本  
主管① 点滴 30 分
- 2) ペムトレキセド(アリムタ) 500 mg/m<sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】  
生食 100ml 1 本  
主管② 点滴 10 分
- 3) カルボプラチン(パラプラチン) 6 AUC 【ケモセーフ使用】  
生食 250ml 1 袋  
主管③ 点滴 1時間
- 4) ベバシズマブ(アバスタ) 15 mg/kg  
生食 100ml 1 本  
主管④ 点滴 初回90分  
2回目60分  
3回目以降30分[\*1]
- 5) 生食 50ml 1 本  
フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

〈2回目 約3時間〉

〈初回 約3時間30分〉