

レジメンcode:	C18-38
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	FOLFOXIRI-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トホ [®] テシ)	150	mg/m ²	点滴(90分)	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エル [®] プラット)	85	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(48時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	ポート確認		
2) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴	30分		
3) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
ブスコパン	20mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	15 分		
4) イリノテカン(トホ [®] テシ)		150 mg/m ²	【ケモセーフ使用】		
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管③	点滴	90分		
5) オキサリプラチン(エル [®] プラット)		85 mg/m ²	【ケモセーフ使用】		
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管④	点滴	2時間		
6) レボホリナート		200 mg/m ²			
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	▶側管①	点滴	2時間	主管④と同時に[*]	
7) 生食	50ml	1 本			
	主管⑤	フラッシュ			
8) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²			
生食	100ml	総液量140ml になるように調製			
	主管⑥	点滴	48時間	(インフューザー)	

〈所要時間 ー〉

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	ルートロック		
--------------	------	-----	--------	--	--

〈所要時間 ー〉