

レジメンcode:	C35-43
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	CDDP+PEM+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PEM	ペメトレキセド(アリムタ)	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴(10分)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

\*CDDP+PEM+Bv導入療法4サイクル実施後、C35-26(PEM+Bv)の維持療法に移行する。

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

ペメトレキセド(アリムタ)初回投与の1週間以上前～ペメトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで連日投与

- 1) パンビタン 1 g/day  
内服 朝食後

ペメトレキセド(アリムタ)初回投与の1週間以上前～ペメトレキセド(アリムタ)最終投与日から22日目まで9週ごとに1回

- 1) シアノコバラミン 1000 μg 1 A  
筋注

day1【ケモセーフ使用】

- 1) 硫酸Mg補正液 1 A  
生食 500ml 1 袋  
主管① 点滴 2時間
- 2) 生食 500ml 1 袋  
主管② 点滴 2時間
- 3) アロカリス 235mg 1 V  
パロノセトロン 0.75mg 1 V  
デキサート 6.6mg 1 V  
デキサート 3.3mg 1 A  
生食 50ml 1 本  
主管③ 点滴 30分
- 4) ペメトレキセド(アリムタ) 500 mg/m<sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】  
生食 100ml 1 本  
主管④ 点滴 10分
- 5) ラクテック 500ml 1 袋  
主管⑤ 点滴 90分
- 6) シスプラチン(プリプラチン) 75 mg/m<sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】  
生食 500ml 総液量650ml以下になるように生食を調製  
主管⑥ 点滴 2時間
- 7) マンニトールS 300ml 1 袋  
主管⑦ 点滴 1時間

次ページあり

8) ソルラクト	1L		1 袋
	主管⑧	点滴	3時間
9) ベバシズマブ(アバスタ)			15 mg/kg
生食	100ml		1 本
	主管⑨	点滴	初回90分
			2回目60分
			3回目以降30分[*1]
10) 生食	50ml		1 本
		点滴	フラッシュ
11) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約13時間〉

〈2回目 約13時間30分〉

〈初回 約14時間〉

day2、3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉